




Pliocénico

Cascalheira

COMPLEXO ALÓCTONE SUPERIOR

Proterozóico Superior - Câmbrio

Doleritos anfibolitizados

Micaxistos de Lagoa:
micaxistos e metagrauvaques
com intercalações tufíticas

Ortognaisses de Lagoa

Peridotitos (Ψ)

Granulitos anfibolitizados (G)

COMPLEXO ALÓCTONE INTERMÉDIO

Silúrico (?)

Anfibolitos (A); Plagiogranitos (*)

Anfibolitos retrogradados (A_r)

Complexo de dique em dique

Complexo de dique em gabro

Flaser gabro

Peridotitos (Ψ)

Piroxenitos anfibolitizados (Ψ_p)

- falha

COMPLEXO ALÓCTONE INFERIOR

Devónico Inferior

Formação de Macedo de Cavaleiros:
xistos e quartzofilitos com intercalações
de metavulcanitos básicos (*) e
calcários (**)

Silúrico Inferior

Complexo Vulcano-Silíceo:
xistos e tufitos com intercalações de
calcários (*), e metavulcanitos
ácidos (**) e básicos (***)

Ordovícico Superior

Formação Filito-Quartzítica:
xistos e quartzofilitos com
intercalações de quartzito (*) e
metavulcanitos ácidos (**)

COMPLEXO PARAUTÓCTONE

Silúrico Inferior e Devónico Superior

xistos, quartzitos e grauvaques.

deformação D_1

70 - xistossidade

70 - estiramento

- carreamento / cavalgamento